


Algoritmo de manejo CLAVE AMARILLA



- UNFPA - PSH -




Ecuador
sin muertes maternas

Que el inicio de una nueva vida
no sea el final de la tuya.



Ministerio
de Salud Pública

Algoritmo de manejo CLAVE AZUL



*Se realizarán las pruebas de acuerdo a la disponibilidad del establecimiento de salud. **Proteinuria, de acuerdo a disponibilidad realizar Proteinuria en tirilla, relación proteinuria/creatinuria en orina al azar.

Preparación y administración de sulfato de magnesio en preeclampsia.

1. **Impregnación**: 20 mL de sulfato de magnesio al 20 % (4 g) + 80 mL de solución isotónica, pasar a 300 mL/hora en bomba de infusión o 100 gotas/minuto con equipo de venoclisis en 20 minutos (4 g en 20 minutos).
2. **Mantenimiento**: 50 mL de sulfato de magnesio al 20 % (10 g) + 450 mL de solución isotónica, pasar a 50 mL/hora en bomba de infusión o 17 gotas /minuto con equipo de venoclisis (1 g/hora).

Tomado de: MSP, 2016 (12)

- UNFPA - PSH -




Ecuador
sin muertes maternas

Que el inicio de una nueva vida
no sea el final de la tuya



Ministerio
de **Salud Pública**

Algoritmo de manejo CLAVE ROJA



En los establecimientos de **Primer Nivel** se deberá realizar las medidas mencionadas y se deberá activar la **RED** para **TRANSFERIR** a la paciente a una unidad de mayor complejidad.

Acido Tranexámico 1gr IV. Ver Indicaciones

UNFPA - PSH -



Ecuador
sin muertes maternas

Que el inicio de una nueva vida
no sea el final de la vida



Ministerio
de **Salud Pública**

Nuevo logo